

Brandt® Agrasol ZMFB

EC FERTİLİZER

Bor(B), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-Sülfat), Çinko(Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Kullanım Dozu ve Dönemi

Brandt Agrasol ZMFB Extra bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilen formda bulunan mikro besin elementlerini içerir. Büyümenin tüm dönemlerinde kullanılabilir. Tarla bitkileri dozları dekar bazında alınabilir. Alınacak sonuçlar ve verim, iklim, bitki, toprak özellikleri vb faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme programları geliştirilmesi tavsiye edilir.

BİTKİ ADI	KULLANMA DÖNEMİ	UYGULAMA ADEDİ	YAPRAKTAN gr/100 L su
Sebzeler(Domates, Biber, patlıcan, fasulye, hıyar vb)	Çiçek başlangıcından itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15-20 gün aralıklarla	1-3	150-300
Turuncgiller	Çiçeklenme öncesi, tam çiçeklenmeden 20-30 gün sonra, meyve gelişimi geç dönemleri	2-3	200-300
Bağ	Sürgün gelişimi ile birlikte, çiçek bitiminden hemen sonra , ben düşmeden önce	2-3	150-300
Sert çekirdekli meyveler(şeftali, kayısı, kiraz, erik vb.)	Çiçeklenme sonrası ve 15-20 gün sonra	1-2	150-300
Yumuşak çekirdekli meyveler (Elma, armut, ayva vb.)	Meyve ve ceviz iriliğine gelince ve olgunlaşma başlangıcında	1-2	150-300
Buğday, arpa vb	Kardeşlenme dönemi	1	150-200
Yumrulu bitkiler	4-6 yapraklı dönem	1	150-300
Zeytin	Meyve tutumu ile birlikte, renklenmeye kadar	1-2	150-300
Mısır	5-6 yaprakta iken	1	200-250
Pamuk	Tarak öncesi, 15-20 gün sonrasında	2	150-300
Çilek	Çiçeklenme öncesinde başlanarak	2-3	150-250
Çeltik	Kardeşlenme başlangıcı ve sapa kalkma dönemi	1-2	200-250
Lahana, Marul vb	Göbek bağlamaya yakın 10-15 gün ara ile	1-2	150-250
Toprağa yapılacak uygulamalarda genel doz			1-2 kg/da

Firma Beyanı

Firma etiket doğrultusunda uygun olarak ve depolandığı ve kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım, depolama ve karışımlardan doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı uygulamalar sonucunda karşılaşılabilecek toksisite, kalıntı etkisi vb. sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Karışılabilirlik

Tankın ½ sini su ile doldurunuz. Başka materyal ekmeden önce Brandt Agrasol ZMFB Extra' yi ayrı bir yerde çözülüp tanka ekilmesi tavsiye edilir. Tankın geri kalanını karıştırıcının devamlı çalışmasını sağlayarak su ile tamamlayınız. Yaygın kullanılan tarım kimyasallarının birçoğu ile karışabilir. Karışım yapılmadan önce kavanoz testi yapılması önerilmektedir.

Depolama Şartları

Orijinal ambalajında serin, kuru ve havadar yerde muhafaza ediniz. Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Depolama sıcaklığı 5-40C arasında olmalıdır.

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Bor (B)	%1.8
Suda Çözünür Demir(Fe)	%2.7
Suda Çözünür Mangan(Mn)	%5.4
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%5.4

Uyarılar

Kullanmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu unsurlar kullanınız.
Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temasında bol su ile yıkayınız.
Teneffüs etmeyiniz, yutmayınız. Aksi halde ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktora başvurunuz.
Kullanılmış boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz başka amaçlar için kullanmayınız.

Bakanlık Lisans No: 1338

Şarj Numarası: XXXXXX

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Net Miktarı: 10 kg

Tescil No:

Üretim Tarihi: DD/MM/YYYY

BRANDT®

Üretici Firma
Brandt Consolidated Inc.,
2935 South Koke Mill Road
Springfield Illinois 62711 USA.
www.brandt.co

agrobest®
GRUP

İthalatçı ve Türkiye Distribütörü
Agrobest Grup
Tarım İlaçları Toh. İml. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Kemalpaşa OSB, Mah. Kazım Karabekir Cd.No:61
Ulucak- Kemalpaşa - İzmir /Türkiye
Tel: +90 232 877 17 70
Fax: +90 232 877 17 71
www.agrobestgrup.com